

# AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA

Paciente: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_ Sexo: ☐ M ☐ F

Procedimento Cirúrgico/Diagnóstico Proposto: \_\_\_\_\_  
Cirurgião: \_\_\_\_\_ Convênio: \_\_\_\_\_

## ANTECEDENTES PESSOAIS

☐ Tabagismo Cigarros/dia: \_\_\_\_\_ Tempo: \_\_\_\_\_ ☐ Negativo  
☐ Etilismo Quantidade: \_\_\_\_\_ Tempo: \_\_\_\_\_ ☐ Negativo  
☐ Uso de Tóxicos: \_\_\_\_\_ Tempo: \_\_\_\_\_ ☐ Negativo  
☐ Alergias: \_\_\_\_\_ ☐ Negativo

## ANTECEDENTES FAMILIARES PATOLÓGICOS

## INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO (Marcar os sintomas/sinais positivos e detalhar se necessário)

SISTEMA CARDIOVASCULAR ☐ Negativo ☐ HAS há \_\_\_\_\_ ☐ Arritmias ☐ IAM ☐ ICO ☐ Angina ☐ Outros \_\_\_\_\_  
SISTEMA RESPIRATÓRIO ☐ Negativo ☐ Asma ☐ Bronquite ☐ DPOC ☐ Outros \_\_\_\_\_  
SISTEMA DIGESTIVO ☐ Negativo ☐ Dor epigástrica ☐ Gastrite ☐ Refluxo ☐ Hepatite ☐ Cirrose ☐ Outros \_\_\_\_\_  
SISTEMA UROGENITAL ☐ Negativo ☐ IRA ☐ IRC ☐ ITU ☐ Dor lombar ☐ DUM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
SISTEMA ENDÓCRINO ☐ Negativo ☐ Diabetes há \_\_\_\_\_ ☐ Insuficiência Adrenal ☐ Doenças da tireóide: \_\_\_\_\_ ☐ Outros \_\_\_\_\_  
SISTEMA HEMATOLÓGICO ☐ Negativo ☐ Anemia ☐ Hemotransfusão prévia ☐ Coagulopatias ☐ Outros \_\_\_\_\_  
SISTEMA IMUNOLÓGICO ☐ Negativo ☐ HIV ☐ Quimioterapia \_\_\_\_\_  
SISTEMA LOCOMOTOR ☐ Negativo ☐ Déficit de locomoção ☐ Fraqueza Muscular ☐ Dor articular ☐ Patologias da coluna ☐ Outros \_\_\_\_\_  
SISTEMA NEUROLÓGICO ☐ Negativo ☐ AVE ☐ Convulsão ☐ Cefaléia ☐ Parestesias ☐ Desmaio ☐ Distúrbios Psíquicos

OBS: \_\_\_\_\_ Medicamentos em uso: \_\_\_\_\_

| CIRURGIAS ANTERIORES | ANESTESIA | HÁ QUANTO TEMPO | INTERCORRÊNCIAS |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1. _____             |           |                 |                 |
| 2. _____             |           |                 |                 |
| 3. _____             |           |                 |                 |
| 4. _____             |           |                 |                 |
| 5. _____             |           |                 |                 |

## EXAME FÍSICO

Peso: \_\_\_\_\_ kg Altura: \_\_\_\_\_ cm PA: \_\_\_\_\_ mmHg FC: \_\_\_\_\_ bpm Estado Geral: ☐ B ☐ M

OBS: \_\_\_\_\_

## VIAS AÉREAS

Mandíbula: ☐ Normal ☐ Prognatismo ☐ Retrognatismo Abertura de Boca (D.I. \_\_\_\_\_ 35mm)M  
Mallampati: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV  
Dentes: \_\_\_\_\_ Próteses Dentárias: ☐ Superior ☐ Inferior ☐ Fica ( \_\_\_\_\_  
Mobilidade do pescoço: \_\_\_\_\_ Distância tireo/mento ( \_\_\_\_\_

APARELHO RESPIRATÓRIO: \_\_\_\_\_

APARELHO CARDIOVASCULAR: \_\_\_\_\_

OUTROS: \_\_\_\_\_

ACESSO VENOSO: \_\_\_\_\_

## EXAMES LABORATORIAIS

Hb: \_\_\_\_\_ Ht: \_\_\_\_\_ Plaquetas: \_\_\_\_\_ TP: \_\_\_\_\_ RNI: \_\_\_\_\_ TTPA: \_\_\_\_\_

Na+: \_\_\_\_\_ K+: \_\_\_\_\_ Ca++: \_\_\_\_\_ Mg++: \_\_\_\_\_ Glicemia: \_\_\_\_\_ Uréia: \_\_\_\_\_ Creatinina: \_\_\_\_\_

Outros: \_\_\_\_\_

RX de Tórax: \_\_\_\_\_

ECG: \_\_\_\_\_

ECO: \_\_\_\_\_

Outras Avaliações: \_\_\_\_\_

ESTADO FÍSICO (ASA) ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐ P5 ☐ P6

## CONDUTA

LIBERADO: ☐ SIM ☐ NÃO RETORNO: \_\_\_\_\_

\*Em caso de alterações significativas do quadro clínico do paciente e/ou seus sinais vitais, a indicação/viabilidade da anestesia será revista pelo anestesiolegista no momento da execução do ato

ORIENTAÇÕES: Jejum: \_\_\_\_\_ MPA: \_\_\_\_\_ Dose: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Caráter: ☐ Eletivo ☐ Urgência ☐ Emergência

### INTERVENÇÃO CIRÚRGICA REALIZADA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[illegible]

## NOTES

[illegible][illegible]

# PROCESSO DE ENFERMAGEM INTRAOPERATÓRIO

## I- IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE / RECEPÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Protuário: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_ Sexo: ☐ F ☐ M Local Internação: \_\_\_\_\_

Admissão do paciente: \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas Cirurgia: \_\_\_\_\_

Precaução: ☐ Não ☐ Contato ☐ Respiratório Sítio Cirúrgico segundo paciente: \_\_\_\_\_

ISVV: PA \_\_\_\_/\_\_\_\_ mmhg FC \_\_\_\_ bpm Saturação O2 \_\_\_\_% Alergias: ☐ Não ☐ Sim, especificar: \_\_\_\_\_

Consciência: ☐ Orientado ☐ Desorientado ☐ Comatoso ☐ Sonolento ☐ \_\_\_\_\_ Jejum: ☐ Não ☐ Sim

Transporte: ☐ Deambulando ☐ Cadeira de rodas ☐ Maca

Doenças Associadas: ☐ Não ☐ HAS ☐ Diabetes ☐ \_\_\_\_\_ Medicamentos: \_\_\_\_\_

Função Venosa: ☐ Não ☐ Sim, Local: \_\_\_\_\_ Abocath nº \_\_\_\_\_ Sondas/Drenos: ☐ Não ☐ Sim, especificar: \_\_\_\_\_

Adornos: ☐ Não ☐ Sim, Qual? \_\_\_\_\_, foi retirado, identificado e encaminhado para \_\_\_\_\_

Anotações de Enf.: \_\_\_\_\_

Assinatura/carimbo profissional Enf.: \_\_\_\_\_

## II- ANTES DA INDUÇÃO ANESTÉSICA / CHECK-LIST CIRURGIA SEGURA

☐ Pulseira de identificação

☐ Termo de consentimento assinado

☐ Paciente confirmou identidade, sítio cirúrgico, procedimento e consentimento?

☐ Sítio cirúrgico demarcado?

☐ Checagem de equipamento anestésico concluída?

☐ OPME em SO?

☐ Oxímetro de pulso está no paciente e em funcionamento?

☐ Risco de perda sanguínea 500ml (7ml/kg em crianças)

☐ Acesso venoso adequado e possui planejamento para fluidos

☐ Reserva de sangue

☐ Vaga em CTI

Cirurgião: \_\_\_\_\_ 1º Auxiliar: \_\_\_\_\_ 2º Auxiliar: \_\_\_\_\_

Anestesista: \_\_\_\_\_ Circulante: \_\_\_\_\_ Instrumentador: \_\_\_\_\_

Anestesia: \_\_\_\_\_ Início Anestesia: \_\_\_\_:\_\_\_\_ h Término: \_\_\_\_:\_\_\_\_ h

SO nº \_\_\_\_\_



Legenda: S- sim N- não NA- não se aplica

## III- ANTES DA INCISÃO CIRÚRGICA / CHECK-LIST CIRURGIA SEGURA

☐ Todos os profissionais da equipe confirmam seus nomes e profissão.

☐ Cirurgião, anestesista e equipe de enf. confirmam verbalmente: Identificação do paciente, local da cirurgia e procedimento.

☐ Antibiótico profilático nos últimos 60 minutos?

☐ Possui exames complementares disponíveis?

Início da cirurgia: \_\_\_\_:\_\_\_\_ h Término: \_\_\_\_:\_\_\_\_ h

Cirurgia Realizada: \_\_\_\_\_

Procedimentos:

☐ Abocath nº \_\_\_\_ Local: \_\_\_\_\_ ☐ Acesso Central, local: \_\_\_\_\_

☐ SNG nº \_\_\_\_ ☐ SVD nº \_\_\_\_ ☐ Drenos tipo: \_\_\_\_\_, local: \_\_\_\_\_

Eletrodo: \_\_\_\_\_

Garrote \_\_\_\_\_

Placa neutra \_\_\_\_\_

PNI \_\_\_\_\_

PAM \_\_\_\_\_

Oxímetro \_\_\_\_\_

Intubação \_\_\_\_\_

Cateter O2 \_\_\_\_\_

Inc. Cirúrgica \_\_\_\_\_

0 Intracath \_\_\_\_\_

1 Drenos \_\_\_\_\_

2 Coxins \_\_\_\_\_

3 Acesso Venoso Periférico \_\_\_\_\_


Posição para Degermação/Antissepsia: \_\_\_\_\_

Posição: ☐ Decúbito dorsal ☐ Decúbito lateral ☐ Decúbito ventral

☐ Semifowler ☐ Fowler ☐ Litotomia

☐ Trendelenburg ☐ Trendel. Invertido ☐ Posição Renal

☐ Cadeira de praia ☐ Ginecológica



Legenda: S- sim N- não NA- não se aplica

# CONTROLE DA SAÍDA DA SALA OPERATÓRIA / CHECK-LIST CIRURGIA SEGURA

Cirurgião, Anestesiologista e equipe de enfermagem confirmam verbalmente:

☐ Procedimento realizado;

☐ Infusão venosa identificada;

Conferência: **Compressas Grandes:**

**Compressas Pequenas:**

**Gaze:**

**Instrumental:**

Quantidade oferecida: \_\_\_\_\_

Devolvida: \_\_\_\_\_

Quantidade oferecida: \_\_\_\_\_

Devolvida: \_\_\_\_\_

Quantidade oferecida: \_\_\_\_\_

Devolvida: \_\_\_\_\_

Quantidade oferecida: \_\_\_\_\_

Devolvida: \_\_\_\_\_

☐ Material para exames identificados e requisições preenchidas:

( ) Histopatológico ( ) Cultura ( ) RX ( ) Outros: \_\_\_\_\_

☐ Houve problemas com equipamentos para ser resolvido? Qual: \_\_\_\_\_

☐ A equipe analisa as preocupações e manejos com o pós operatório?

**Potencial de Contaminação:** ☐ Limpa ☐ Potencialmente Contaminada ☐ Contaminada ☐ Infectada

**Escopia/RX utilizado em SO:** ☐ Não ☐ Sim

**Soluções Infundida:** ☐ SF 0,9% ☐ Ringer/Lactato Nº frascos: \_\_\_\_\_ Volume Total Infundido: \_\_\_\_\_

**Hemotransfusão:** ☐ Não ☐ Sim, Hemocomponente? \_\_\_\_\_ Nº Bolsas: \_\_\_\_\_

**Drenos:** ☐ Não ☐ Sim, Qual? \_\_\_\_\_ Volume: \_\_\_\_\_ Características: \_\_\_\_\_

**Sondas:** ☐ Não ☐ SNG ☐ SNE ☐ SVD Volume: \_\_\_\_\_ Características: \_\_\_\_\_

**Irrigação Vesical:** ☐ Não ☐ Sim, Volume: \_\_\_\_\_ Características: \_\_\_\_\_

## DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

## PRESCRIÇÕES DE ENFERMAGEM INTRAOPERATÓRIO

CHECAGEM

- ☐ Medo
- ☐ Ansiedade
- ☐ Risco para aspiração
- ☐ Risco de desequilíbrio da Tº Corporal
- ☐ Risco para infecção
- ☐ Risco de lesão (por bisturi elétrico)
- ☐ Risco de lesão (por posicionamento operatório)
- ☐ Risco de volume de líquidos deficiente
- ☐ Risco para sangramento
- ☐ Deficit no autocuidado
- ☐ Risco para padrão respiratório ineficaz
- ☐ Comunicação verbal prejudicada
- ☐ Mobilidade física prejudicada
- ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_

Enfermeiro: \_\_\_\_\_  
(Assinatura/carimbo)

- ☐ Auxiliar no transporte da maca para mesa de cirurgia e no posicionamento
- ☐ Permanecer com o paciente e identificar suas necessidades
- ☐ Proporcionar tranquilidade e conforto
- ☐ Observar o posicionamento do paciente e a presença de secreções aspirar S/N;
- ☐ Identificar infusões venosas e inserção de drenos cateteres e tubos;
- ☐ Observar e anotar náuseas, vômitos e sangramentos;
- ☐ Manter o paciente aquecido (cobertores, colchão térmico);
- ☐ Infundir líquidos aquecidos;
- ☐ Sempre que possível, manter as regiões do corpo do paciente cobertas
- ☐ Utilizar técnicas assépticas durante procedimentos
- ☐ Manter o menor número de pessoas dentro da SQ se possível;
- ☐ Inspeccionar o local de inserção da placa de bisturi elétrico quanto a fios desencapados, dobrados e presença de nós;
- ☐ Após o posicionamento do paciente, certificar-se de que ele não está encostado em nenhum metal ou equipamento;
- ☐ Manter hidratação venosa pérvia;
- ☐ Observar balanço hídrico;
- ☐ Observar SSVVs (FC, PA e SPO2);
- ☐ Proteger proeminências ósseas;
- ☐ \_\_\_\_\_

Anotações de Enfermagem:

Paciente encaminhado: ☐ SRPA ☐ Unidade de Internação, qual: \_\_\_\_\_ ☐ UTI, qual: \_\_\_\_\_ ☐ Patologia \_\_\_\_\_

às \_\_\_\_\_ horas

Assinatura e carimbo do Profissional de Enf. em SO: \_\_\_\_\_



## Consumo em Sala de Operação /Centro Cirúrgico

Nome: \_\_\_\_\_

Cirurgia: \_\_\_\_\_

Entrada de sala: \_\_\_\_\_ h

Cirurgião: \_\_\_\_\_

Saída de sala: \_\_\_\_\_ h

Anestesiologista: \_\_\_\_\_

Pront: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Leito: \_\_\_\_\_

Circulante: \_\_\_\_\_

| Ar comprimido |               | Oxigênio      | Oxido Nitroso | Nitrogênio    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Início: _____ | Início: _____ | Início: _____ | Início: _____ | Início: _____ |
| Termo: _____  | Termo: _____  | Termo: _____  | Termo: _____  | Termo: _____  |

| Soluções |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Uso      | Descrição                                       |
|          | Água destilada ml, fr                           |
|          | Água Oxigenada                                  |
|          | Álcool 70%                                      |
|          | Azul de metileno                                |
|          | ( ) Benzina ( ) Éter                            |
|          | Clorexidina Degermante ( ) 2% ( ) 4%            |
|          | Clorexidina ( ) Alcolólica ( ) Aquosa           |
|          | Contraste radiológico ( ) iônico ( ) não iônico |
|          | Formol 10%                                      |

| Soluções |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Uso      | Descrição                           |
|          | Manitol 20% 250ml, fr               |
|          | PVPI ( ) Degermante ( ) Tópico      |
|          | S. Fisiológico 0,9% _____ ml, fr    |
|          | S. Glicosado _____ % _____ ml, fr   |
|          | Sorbitol + Manitol 1000ml, fr       |
|          | S. Ringer Lactato 500ml, fr         |
|          | Solução Cardioplégica ST. Tomaz, fr |
|          | Vaselina Líquida                    |
|          | Outros: _____                       |

| Materiais |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| QTDE      | DESCRIÇÃO                                       |
|           | Abocath nº _____                                |
|           | Agulha Biopsia                                  |
|           | Agulha descartável nº _____                     |
|           | Agulha descartável nº _____                     |
|           | Agulha descartável nº _____                     |
|           | Agulha para peridural nº _____                  |
|           | Agulha para raqui nº _____                      |
|           | Agodão ortopédico _____ cm                      |
|           | Aparelho de tricotomia                          |
|           | Atadura de crepe _____ cm                       |
|           | Atadura gessada _____ cm                        |
|           | Avental descartável                             |
|           | Campo oftálmico descartável                     |
|           | Campo operatório descartável                    |
|           | Cânula p/ eletroneuro estimulação nº _____      |
|           | Cânula de guedel nº _____                       |
|           | Cânula de traqueostomia nº _____                |
|           | Capa descartável para videocirurgia             |
|           | Cateter de Oxigênio tipo óculos                 |
|           | Cateter duplo lumen para hemodiálise            |
|           | Cateter duplo lumen para infusão venosa         |
|           | Cateter epidural nº 16                          |
|           | Clip para videocirurgia                         |
|           | Coletor de urina sistema fechado                |
|           | Coletor sistema aberto 2000 ml                  |
|           | Coletor Infantil                                |
|           | Coletor universal 80 ml ( ) simples ( ) estéril |
|           | Compressa ( ) grande ( ) pequena                |
|           | Cotonete                                        |
|           | Dispositivo de transferência de soro            |
|           | Dreno de Kher nº _____                          |
|           | Dreno de Penrose nº _____                       |
|           | Dreno de tórax nº _____                         |
|           | Dreno de suctor nº _____                        |
|           | Eletrodo ( ) adulto ( ) neonatal                |
|           | Equipo de Bureta                                |
|           | Equipo ( ) macrogotas ( ) microgotas            |
|           | Equipo p/ bomba de infusão ( ) simples ( ) foto |
|           | Equipo PVC                                      |
|           | Equipo para sangue                              |
|           | Esparadrapo _____ cm                            |
|           | Espátula de madeira                             |
|           | Esponja Hemostática                             |

| Materiais |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| QTDE      | DESCRIÇÃO                                         |
|           | Extensor para infusão venosa ( ) simples ( ) foto |
|           | Faixa de Smarch nº _____                          |
|           | Fita crepe _____ cm                               |
|           | Fita p/ glicemia capilar                          |
|           | Filtro bacteriano e viral ( ) adulto ( ) infantil |
|           | Fralda tamanho: _____                             |
|           | Gaze 7,5 x 7,5                                    |
|           | Gel de contato _____ gramas                       |
|           | Gorro descartável                                 |
|           | Intracath nº _____                                |
|           | Kit placa / bolsa / clamp p/ colostomia           |
|           | Lâmina de bisturi nº _____                        |
|           | Lente Oftálmica nº _____                          |
|           | Luva de procedimento tamanho: _____               |
|           | Luva estéril nº _____                             |
|           | Malha tubular _____ cm                            |
|           | Máscara                                           |
|           | Máscara Laringea nº _____                         |
|           | Máscara N95                                       |
|           | Micropore _____ cm ( ) estéril                    |
|           | Placa de bisturi                                  |
|           | Polifix _____ vias                                |
|           | Sapatilha                                         |
|           | Scalp nº _____                                    |
|           | Seringa descartável _____ ml                      |
|           | Seringa descartável _____ ml                      |
|           | Seringa descartável _____ ml                      |
|           | Seringa gasometria _____ ml                       |
|           | Seringa peridural                                 |
|           | Sonda de aspiração traqueal nº _____              |
|           | Sonda endobronquial nº _____                      |
|           | Sonda Foley _____ vias nº _____                   |
|           | Sonda nasogástrica nº _____                       |
|           | Sonda uretral nº _____                            |
|           | Tampa polifix                                     |
|           | Torneirinha rotativa 3 vias                       |
|           | Transdutor de pressão (DOMUS)                     |
|           | Tubo coletor de amostra sanguínea                 |
|           | Tubo endotraqueal nº _____ ( ) aramado            |
|           | Tubo TCA                                          |
|           | Outros: _____                                     |

# QTDE DESCRIÇÃO

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Ac. Tranexâmico 250 mg/5ml                        |
| Ácido aminocapróico 1g/20ml, fr                   |
| Adrenalina 1mg/1ml ampola                         |
| Adenosina 6mg/2ml                                 |
| Alfentanila 0,544 mg/ml, 5ml amp                  |
| Amicacina 500mg/2ml, amp                          |
| Amido Hidroxietílico 6% 500ml                     |
| Aminofilina 240mg/10ml, amp                       |
| Amiodarona 150mg/3ml                              |
| Ampicilina 500mg F/A                              |
| Atracurium ( ) 10mg/ml 5ml ( ) 25mg/2,5ml         |
| Atropina 0,25mg/1ml, amp                          |
| Atropina 1% sol. Oftálmica                        |
| Bicarbonato de Sódio 8,4% ( ) ampola ( ) frasco   |
| Bromoprida 10mg/2ml                               |
| Bupivacaína + glicose (pesada), amp               |
| Bupivacaína 0,5% S/V 100mg/20ml, amp              |
| Bupivacaína isobárica 0,50% 20mg/4ml amp          |
| Carbacol 0,2mg/2ml sol.oftálmica                  |
| Cefalotina 1 g, F/A                               |
| Cefazolina 1 g, F/A                               |
| Cefotaxima 1g, F/A                                |
| Cefoxitina 1g, F/A                                |
| Ceftriaxona 1g, F/A                               |
| Cefuroxima 750mg F/A                              |
| Cetamina 500mg/10ml F/A                           |
| Cetoprofeno 100mg                                 |
| Ciprofloxacino 200mg bolsa                        |
| Clonidina 150mcg/ml, amp                          |
| Cloranfenicol sol. Oftálmica                      |
| Cloreto de Potássio 19,1% 10ml, amp               |
| Cloreto de Sódio 20% 10 ml, amp                   |
| Colagenase 0,6U/g, bisnaga 30 gr                  |
| Deslanosídeo 0,4mg/2ml, amp                       |
| Dexametasona 10mg/2,5ml, amp                      |
| Dexametsona ( ) sol. Oftálmica ( ) pom. Oftálmica |
| Diazepam 10mg/2ml, amp                            |
| Difenidramina 50mg/ml, amp                        |
| Dipirona 1g/2ml, amp                              |
| Dobutamina 250mg/20ml, amp                        |
| Dopamina 50mg/10ml, amp                           |
| Droperidol 2,5mg/1ml, amp                         |
| Escopolamina 20mg/ml , amp                        |
| Etilefrina 10mg/1ml, amp                          |
| Etomidato 20mg/10ml,amp                           |
| Fenilefrina 10% sol. Oftálmica 5 ml               |
| Fenitoína 250mg/5ml, amp                          |
| Fentanil 0,5mg/10ml F/A                           |
| Flumazenil 0,5mg/5ml, amp                         |
| Furosemida 20mg/2ml, amp                          |
| Gentamicina ( ) sol. Oftálmica ( ) pom. Oftálmica |

# QTDE DESCRIÇÃO

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Gentamicina _____ mg/ _____ ml, amp                 |
| Glicose _____ 10ml, amp                             |
| Gluconato de cálcio 10% 10ml, amp                   |
| Heparina 25.000 UI/5ml, Fr                          |
| Hidrocortisona 500mg, amp                           |
| Insulina regular 1.000 UI/ 10ml, fr (UI)            |
| Isossorbida 10mg/ml                                 |
| Lidocaína 10% spray Fr 50ml                         |
| Lidocaína 2% ( ) bisnaga ( ) geléia seringa estéril |
| Lidocaína 2% Sem Vaso 20ml                          |
| Metilcelulose                                       |
| Metocloropramida 10mg/2ml, amp                      |
| Metoprolol 5mg/5ml, amp                             |
| Metronidazol 500mg/100ml                            |
| Midazolam _____ mg/ _____ ml, amp                   |
| Morfina _____ mg/ _____ ml, amp                     |
| Naloxona 0,4mg/1ml, amp                             |
| Neostigmina 0,5mg/1ml, amp                          |
| Nitroglicerina 25mg/5ml, amp                        |
| Nitroprussiato 50mg/2ml, amp                        |
| Noradrenalina 4mg/4ml, amp                          |
| Omeprazol 40mg, F/A                                 |
| Ondansetrona 8mg/4ml, amp                           |
| Papaverina 100mg/2ml, amp                           |
| Parecoxibe 40mg F/A                                 |
| Petidina 100mg/2ml, amp                             |
| Pilocarpina 2% sol. Oftálmica 10ml                  |
| Prometazina 50mg/2ml, amp                           |
| Propofol 1% 20ml ampola                             |
| Propofol 1% 50ml seringa                            |
| Propofol 2% 50ml fr                                 |
| Protamina 5000 UI (50mg) /5ml, amp                  |
| Proximetacaína 5mg/ml sol. Oftálmica 5 ml           |
| Ranitidina 50mg/2ml, amp                            |
| Remifentanila 2mg F/A                               |
| Retinol/aminoácidos/metionina/cloranfenicol pom oft |
| Rocurônio 50mg/5ml, F/A                             |
| Ropivacaína _____ % _____ mg/ _____ ml              |
| Sevoflurano Fr                                      |
| Solução Saline Balanceada                           |
| Sufentanila _____ mcg/ _____ ml, amp                |
| Sulfadiazina de prata 1%                            |
| Sulfato de magnésio 10% 10 ml, amp                  |
| Suxametônio 500mg,F/A                               |
| Tramadol 50mg/1ml, amp                              |
| Triancinolona/neom/gram./nist. creme bisn 30gr      |
| Tropicamida 10mg/ml sol.oftálmica 5ml               |
| Vancomicina 500mg                                   |
| Vitamina C 500mg/5ml, amp                           |
| Outros:                                             |

# FIOS CIRURGICOS / HEMOSTÁTICOS

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| QTDE | DESCRIÇÃO                                  |
|      | Aço nº _____                               |
|      | Algodão 0 c/ag ( ) s/ ag ( )               |
|      | Algodão 2 c/ag ( ) s/ ag ( )               |
|      | Algodão 3 c/ag ( ) s/ ag ( )               |
|      | Algodão 4-0 s/ ag                          |
|      | Catgut nº _____ Ag ( ) Simples ( ) Cromado |
|      | Cera p/ osso                               |
|      | Fita Cardíaca                              |
|      | Kit Coronária                              |
|      | Monofyl nº _____ Ag                        |
|      | Mononylon nº _____ Ag                      |
|      | Mononylon nº _____ Ag                      |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| QTDE | DESCRIÇÃO                         |
|      | Poliester nº _____ Ag             |
|      | Poliester nº _____ Ag             |
|      | Poliglecaprone nº _____ Ag        |
|      | Polipropileno nº _____ / _____ Ag |
|      | Polipropileno nº _____ / _____ Ag |
|      | Seda nº _____ S/Ag                |
|      | Valvekit 2-0                      |
|      | Vicryl nº _____ Ag                |
|      | Vicryl nº _____ Ag                |
|      | Vicryl nº _____ Ag                |
|      | Outros:                           |